

**Таблица 4. Содержание ММП-2, ММП-7, ММП-9, ТИМП-1 и ТИМП-2 в сыворотке крови больных раком яичников в зависимости от показателей распространенности опухоли \***

Показатель распространенности	n	ММП-2	ММП-7	ММП-9	ТИМП-1	ТИМП-2
Стадия FIGO						
Ia-Ic	15	186 105-248	5,12,3 3,0-16,2	250 123-1060	261 67,6-567	61,1 54,3-113
IIa-IIb	5	204 134-269	8,04 2,5-10,4	428 126-513	455 98,0-483	54,8
I - II	20	269 105-198	5,31 2,5-16,2	290 123-1060	341 67,6-567	59,0 54,3-113
IIIa-IIIc	21	171 93,1-445	11,52 2,9-43,6	462 109-922	412 83,3-712	83,0 61,3-103
IV	7	181 139-278	20,13 5,4-50,6	478 206-613	245 24,8-505	69,7 66,4-102
III-IV	28	176 93,1-445	13,01,4 2,9-50,6	464 109-922	395 24,8-712	81,3 61,3-103
Размер опухоли по данным УЗИ развуквого о исследования						
До 10 см (1)	7	161 105-240	4,77,8 3,4-16,2	438 123-912	163 83,3-501	61,3 54,3-84,1
Более 10 см (2)	12	173 134-366	8,06,8 3,0-14,7	33,3 0-450	218 67,6-712	73,0 54,9-109
Одностороннее поражение (1+2)	19	168 105-366	6,45 3,0-16,2	404 109-912	188 67,6-712	66,59 54,3-109
Двустороннее поражение (3)	28	195 93,1-445	11,45,6,7 2,9-50,6	440 146-1060	412 24,8-654	88,19 57,0-113
Диссеминация по брюшине						
Нет (1)	15	199 140-269	5,110,11 2,5-16,8	29012,13 109-1060	341 67,6-567	59,0 54,3-113
просовидная (2)	10	192 105-445	12,910 3,8-32,8	53912 206-872	465 215-603	72,7 69,8-88,9
До 2 см (3)	21	171 93,1-371	10,311 2,9-50,6	46013 109-9224	282 24,8-712	83,0 54,9-109
Метастазы в большой сальник						
Нет (1)	24	186 105-269	5,314,15,16 2,5-16,8	290 109-1060	261 67,6-567	61,2 54,3-113
До 2 см (2)	9	230 123-445	15,315 7,4-50,6	464 206-688	350 215-589	72,7 69,7-88,9
2-5 см (3)	9	178 93,1-337	10,616 2,9-32,8	491 343-922	420 184-654	73,0 63,7-96,0
«Панцирный» сальник (4)	7	176 139-371	11,214 5,4-47,2	275 181-743	361 24,8-712	96,3 66,4-113