

Таблица Заболевания и синдромы, имитирующие клиническую картину синдрома ОЖ

Заболевания	Симптомы, напоминающие клинику синдрома ОЖ	Критерии дифференциальной диагностики
Нижнедолевая плевропневмония	Лихорадка; острая боль в животе; нарастание симптомов интоксикации, одышка и гемодинамические расстройства	Отчетливая связь болей в животе с глубоким вдохом; болезненный кашель, мокрота; характерные аускультативные и перкуторные признаки; локальная болезненность при пальпации грудной клетки; данные рентгенографии и компьютерной томографии
Диафрагмальный плеврит	Боли в животе различной локализации; рвота, неукротимая икота (при вовлечении в патологический процесс диафрагмального нерва); повышение температуры тела	Отчетливая связь болей в животе с глубоким вдохом; сухой болезненный кашель; при аускультации – шум трения плевры; локальная болезненность при пальпации грудной клетки
Тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт-пневмония	Внезапное появление сильных болей за грудиной и (редко) в эпигастрии; вздутие живота; признаки болевого шока и коллапса; упорная икота (при поражении диафрагмальной плевры); в части случаев – субфебрилитет	Преимущественная локализация болей в грудной клетке; выраженная одышка; центральный цианоз; при инфаркт-пневмонии крепитация или влажные хрипы в легких, изредка кровохарканье; акцент II тона на легочной артерии; при остром легочном сердце – набухание шейных вен, парадоксальный пульс
Острый инфаркт миокарда (абдоминальный вариант)	Внезапное появление интенсивных (“морфинных”) болей в эпигастрии; тошнота и рвота; парез кишечника; признаки болевого шока и коллапса; субфебрилитет (на 2-й день заболевания)	Данные анамнеза; возраст больных; признаки острой левожелудочковой сердечной недостаточности; аритмии; глухость тонов сердца; ритм галопа; артериальная гипотензия; характерная динамика электрокардиографии (ЭКГ)
Острый фибринозный перикардит	Иррадиация болей в эпигастральную область; иногда рефлексорная дисфагия; субфебрилитет	Усиление болей в положении лежа на спине, при глубоком вдохе, кашле и глотании; частое поверхностное дыхание; шум трения перикарда; характерные изменения ЭКГ, эхокардиографии
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (в отсутствие ущемления) *	Интенсивные боли под мечевидным отростком, в эпигастрии с иррадиацией в межлопаточное пространство и область сердца; боли усиливаются в горизонтальном положении; отрыжка, рвота	Боли возникают после еды, при физической нагрузке, подъеме тяжестей; боли часто купируются спазмолитиками; рвота или отрыжка приносит облегчение; характерны изжога, отрыжка кислым, регургитации; дисфагия, боли в грудной клетке; характерные данные рентгенологического исследования и эзофагогастродуоденоскопии
Приступ желчной колики при желчекаменной болезни (без развития острого калькулезного холецистита) *	Остро возникший приступ болей в правом подреберье и эпигастрии с характерной иррадиацией; тошнота и рвота, не приносящая облегчения; вздутие живота	Боли носят висцеральный характер, обычно купируются спазмолитиками; отсутствуют признаки раздражения брюшины
Болезнь Крона (неосложненное течение) *	Интенсивные боли в правой подвздошной области или левом и правом фланках живота; субфебрилитет	Анамнестические данные; хроническая диарея; выраженное похудание; синдром мальабсорбции; внекишечные аутоиммунные проявления (анемия, поражения суставов, кожи, глаз); при неосложненном течении отсутствуют признаки раздражения брюшины
Язвенный колит (неосложненное течение) *	Боли в животе; повышение температуры тела; вздутие живота; эндотоксемия, метаболические расстройства	Данные анамнеза; боли чаще носят схваткообразный характер; типичные симптомы: многократная водянистая диарея с примесью крови; характерны аутоиммунные внекишечные проявления (артралгии, дерматит, афтозный стоматит, трофические язвы, поражения глаз, остеопороз и др.)
Абдоминальная форма геморрагического капилляротоксикоза (болезни Шенлейн–Геноха) *	Сильные боли в животе, постоянные или схваткообразные, во время которых больные беспокойны, не находят себе места, кричат; рвота; обезвоживание больных, электролитные нарушения; коллапс; лихорадка	Периоды сильной боли могут чередоваться с безболевыми промежутками, продолжающимися около 1–3 часов; папулезно-геморрагическая сыпь на коже; суставной синдром; характерны рвота с кровью, кишечное кровотечение, микро- или макрогематурия
Диабетический кетоацидоз	Тошнота, рвота; острые боли и болезненность при пальпации в эпигастрии; умеренное напряжение мышц брюшной стенки; лейкоцитоз; тахикардия	Данные анамнеза; сильная жажда, частое мочеиспускание; тошнота и рвота обычно предшествуют появлению болей в животе; характерно истощение, сухая кожа, запах ацетона изо рта, сухость во рту, сильная жажда, отсутствие аппетита, иногда дыхание Куссмауля; кетонурия, гликозурия, гипергликемия
Периодическая болезнь	Остро возникающие приступы нестерпимых болей в животе; озноб и подъем температуры тела до 40 °С; напряжение мышц брюшной стенки; положительные симптомы раздражения брюшины; признаки паралитической кишечной непроходимости; лейкоцитоз до 20–30 × 10 ⁹ /л, увеличение СОЭ до 40 мм/ч, лимфопения, анаэозинфилия	Данные анамнеза; наследственность; национальная принадлежность (армяне, арабы, евреи, турки); общая интоксикация не характерна; нет сдвига лейкоцитарной формулы влево; характерно повторение приступов, длящихся 2–3 дня; остро развивающаяся гепатоспленомегалия

Примечание. Символом * обозначены заболевания, прогрессирование которых со временем может приводить к развитию острой хирургической ситуации, в т. ч. острому перитониту.