

Динамика показателей (в баллах) сексуальной функции пациентов с АПЖ на фоне терапии

Показатель	I визит			II визит			III визит			IV визит		
	1-я группа	2-я группа	3-я группа	1-я группа	2-я группа	3-я группа	1-я группа	2-я группа	3-я группа	1-я группа	2-я группа	3-я группа
МИЭФ-5	14,25±1,01	12,55±0,61**	23,59±0,33***	15,42±1,1*	11,79±0,71**	23,93±0,27***	17,9±0,98*	12,44±0,75**	23±0,75***	17,88±1,95*	13,43±2,15**	21,29±1,95
IPSS	10,92±1,26*	14,95±0,88	14,15±1,88	7,63±0,71*	10,86±1,01	8,84±1,73	7,42±1,09	8,27±0,81	8,36±0,62	5,5±1,06	7,9±1,01	8,71±1,91
AMS, сексуальная функция	13,55±0,81	12,75±0,49**	8,05±0,46***	12,68±0,92	13,89±0,69**	7,0±0,6***	12,05±0,89	12,86±0,8**	7,38±0,94***	10,91±1,25	11,77±1,2**	7,57±0,9***
BSFI оценка эрекции	3,62±0,63	3,34**±0,38	9,26±0,58***	3,76±0,51	3,52±0,54**	9,2±0,8***	4,76±0,52	3,7±0,57**	8,56±0,96***	5,05±1,01	4,33±0,88**	9±1,2
BSFI общая удовлетворенность	1,29±0,24*	2,17±0,2**	3,47±0,26***	1,48±0,21*	2,19±0,21**	3,1±0,23***	2,19±0,21	2,67±0,23	2,78±0,22	3,67±1,2	3,13±0,3	3±0,34

Примечание. Достоверность различий: * – между 1-й и 2-й группами, ** – между 2-й и 3-й группами, *** – между 1-й и 3-й группами при $p < 0,05$. Жирным шрифтом выделены достоверные внутригрупповые различия ($p < 0,05$).